

Incidencia de Infección Urinaria c/1000 días

Informe SatiQ

Cant. Total de Pacientes: 5625 100.00 %

2.95

Min.Max.EstadíaModoMedianaDesv.Estadía:1Estadía:6.36Estadía:1.00Estadía:3.00Estandar:9.52

Mortalidad en UTI: 1209 21.49 % Mortalidad Esperada: 22.04 % (RME: 0.98)

| | | | | | | TO ¹ | ΓAL | % |
|--|-------|---------|----------|-------|--------|-----------------|-------|-------|
| Episodios con escaras | | | | | | 10 |)4 | 1.85 |
| Pacientes con ARM y VNI | | | | | | 25 | 53 | 4.50 |
| Pacientes con ARM y VI | | | | | | 19 | 54 | 34.74 |
| Episodios con neumonía asociada a ARM | | | | | | | | 13.77 |
| Pacientes con cateter | | | | | | 1814 | | 32.25 |
| Episodios con infecciones asociadas a cateter | | | | | | 35 | | 1.93 |
| Pacientes con sonda foley | | | | | | 3640 | | 64.71 |
| Episodios con infección urinaria asoc. a sonda foley | | | | | | = | 6 | 1.26 |
| Episodios con deslizamientos no prog. de la cama | | | | | | | 4 | 0.07 |
| Reingresos | | | | | | | 96 | 5.26 |
| Pacientes del Sexo Femenino | | | | | | | | 35.80 |
| Pacientes del Sexo Mascul | ino | | | | | 36 | 11 (| 64.20 |
| | Modo | Mediana | Total | % | Mínimo | Máximo | Media | SD |
| APACHE | 10.00 | 13.00 | | | 1.00 | 54.00 | 14.73 | 8.99 |
| SOFA | 6.00 | 6.00 | | | 1.00 | 22.00 | 6.56 | 3.76 |
| TISS | 28.00 | 23.00 | | | 1.00 | 55.00 | 23.20 | 7.62 |
| Edad | 56.00 | 56.00 | | | 16.00 | 100.00 | 54.07 | 19.58 |
| Días Cama de Pacientes con ARM y VI | 1.00 | 5.00 | 17100.66 | 47.79 | 0.01 | 127.00 | 8.23 | 10.88 |
| Días Cama de Pacientes | 1.00 | 1.73 | 853.69 | 2.39 | 0.03 | 62.00 | 2.84 | 4.84 |
| con ARM y VNI | 1.00 | 6.00 | 13059.00 | 36.49 | 1.00 | 100.00 | 7.44 | 6.19 |
| con ARM y VNI Días Cama de Pacientes con CVC | 1.00 | 0.00 | | | | | | |